

RÉDUCTION
DE LA GRAISSE
VISCÉRALE

redu stim

DISPOSITIFS MÉDICAUX 100% MAINS-LIBRES



Traitement de
15 séances de
45 minutes




-7 cm de tour
de taille




Réduction de la
graisse viscérale

**Médecins esthétiques • Nutritionnistes
Diabétologues • Gastroentérologues
Cardiologues • Endocrinologues**

Images scanner avant et après une cure de ReduStim :



Mesure de
l'épaisseur de
graisse viscérale
avant :
51505 mm²



Mesure de
l'épaisseur de
graisse viscérale
après :
40193 mm²

RÉDUIT LA GRAISSE VISCÉRALE DE PLUS DE 8.2%

ÉTUDE PAR IMAGERIE SCANNER DE LA GRAISSE VISCÉRALE (2013)

Dr Bernadette Carpentier, Dr Habib Nouria
Clinique médicale - Nouria

Évaluation de l'impact de ReduStim sur la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale autour du nombril :

Le scanner a montré:

- Une perte moyenne de 5.45 kg du poids et 6% de IMC.
- Une perte moyenne de 7 cm de tour de taille.
- -8.2% de graisse viscérale et -4.1% de graisse sous-cutanée.
- Une perte moyenne de 17.4% d'ASAT et 18% d'ALAT.

CONCLUSION DE L'ÉTUDE :

La technologie BioStimology® diffusée par le REDUSTIM permet une réduction très importante de la graisse viscérale et de la graisse sous-cutanée.

