

AVANT/APRÈS
LA CHIRURGIE
BARIATRIQUE

redu stim

DISPOSITIFS MÉDICAUX 100% MAINS-LIBRES



Traitement de
12 séances de
45 minutes



Réduction de la
graisse viscérale



Diminution des
risques santé

Chirurgiens bariatriques • Spécialistes de l'obésité



AVANT UNE OPÉRATION BARIATRIQUE:

Protocole recommandé

12 séances de 45 minutes (quotidiennement)



Image d'un surplus de graisse abdominale



APRÈS UNE OPÉRATION BARIATRIQUE:

Protocole recommandé

6 séances de 45 minutes (2 fois par semaine)

2 semaines après l'opération



Image d'un foie gras

DIMINUE LA GRAISSE VISCÉRALE ET LA TAILLE DU FOIE



ÉTUDE CLINIQUE RANDOMISÉE EN DOUBLE-AVEUGLE (2010)

Dr Ghislaine Beilin, Dr Rodi Courie

Unité Nutrition - Endocrinologie - Hôpital Pitié Salpêtrière

Évaluation de la perte moyenne de tour de taille chez **28 patients** souffrants d'obésité abdominale après 12 séances de ReduStim: **-6.1 cm**.

- Les 4 autres critères du syndrome métabolique restent inchangés.
- Le taux des transaminases hépatiques a diminué : **-23% ALAT & -13% ASAT**.

CONCLUSION DE L'ÉTUDE :

La baisse plus importante des transminases ALAT (23%) par rapport à la baisse des ASAT (13%) traduit un effet bénéfique de la BioStimology® sur le désengorgement du foie.